

### Progi ekonomicznej szkodliwości wybranych szkodników marchwi

Szkodnik	Stadium szkodliwe	Progi ekonomicznej szkodliwości	Termin lustracji i zabiegu
<i>Połyśnica marchwianka</i>	larwa	od 3 do 4 żółtych tablic lepowych na plantacji (2 pułapki ustawione na brzegach plantacji od strony zakrzewień lub rowu melioracyjnego) – odłowienie średnio 1 muchówki przez kolejne 3 dni	maj, lipiec i sierpień; 2 zabiegi w odstępstwie 5-7 dni
<i>Bawełnica topolowo-marchwiana</i>	owad dorosły, larwa	1 kolonia bawełnic na 0,5 m.b. rzędu uprawy, liczba obserwacji Od 2 do 5 w zależności od wielkości plantacji	od połowy lipca do połowy sierpnia
<i>Rolnice</i>	gąsienica	6 gąsienic lub uszkodzone rośliny na 1m <sup>2</sup> uprawy, wykonanie analizy w 2-3 miejscach a widocznymi uszkodzeniami roślin	marzec-wrzesień
<i>Drutowce</i>	larwa	2 drutowce na 1m <sup>2</sup> uprawy do głębokości 20cm, wykonanie analizy w 2-3 miejscach a widocznymi uszkodzeniami roślin	marzec-wrzesień
<i>Pędraki</i>	larwa	od 5 do 10 pędraków na 1m <sup>2</sup> uprawy do głębokości 20cm, wykonanie analizy w 2-3 miejscach a widocznymi uszkodzeniami roślin	marzec-wrzesień